

RELAȚIA DINTRE INFECȚIA URINARĂ ȘI LITIAZA URINARĂ

Mihaela Zafiu

Clinica de Pediatrie nr.3
U.M.F. Târgo-Mureș

Pornind de la observația clinică referitoare la incidența relativ crescută a cazurilor de infecție urinară asociată cu litiază renourinară și invers, litiază evoluând cu o infecție a tractului urinar la copii, am dorit să cunoaștem mai bine - și am studiat - relația dintre aceste două afecțiuni renourinare. Astfel, am constatat că în decursul a 10 ani (1985-1994) în Clinicile de Pediatrie nr.2 și 3 s-au internat 78 cazuri de litiază urinară, dintre care mai mult de 2/3 s-au asociat și cu infecție urinară. Vârsta acestor copii a fost cuprinsă între 9 luni și 16 ani, de unde rezultă că litiaza urinară se întâlnește la toate categoriile de vârstă, inclusiv la sugari. În cazul nostru, asocierea dintre litiază și infecția urinară a fost mai frecventă la copii între 3 și 6 ani (42 cazuri); 8 cazuri sub vârsta de 3 ani și 28 peste 6 ani. Raportul dintre băieți și fete a fost aproape egal (35/43). Faptul că infecția urinară asociată litiazei evoluează cel mai adesea de o manieră recidivantă și rebelă la tratamentul medical, în plus cu alură de nefropatie obstructivă (pe fond de pielectazie, megaureter sau hidronefroza infectată), ridică probleme uneori dificile de diagnostic și tratament, intrând în discuție și alte afecțiuni care evoluează cu sindrom febril prelungit și stare generală mai mult sau mai puțin alterată. Este aspectul asupra căruia insistăm și ne oprim îndelung, scoțând în evidență rolul investigațiilor radio-urologice.
