

ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ALE MORBIDITĂȚII PRIN MENINGITE ÎN MOLDOVA ÎN ULTIMUL DECENIU

*Angela Romaniuc, Cristina Brăiloiu, Mariana Dumbravă, Anca Nistor,
Luminița Popescu, Mădălina Dospinescu*

Centrul de Sănătate Publică, Iași

În domeniul vast al bolilor infecțioase, fără limite geografice, meningitele ocupă un loc important prin rata crescută de morbiditate și mai ales prin gravitatea evoluției și a indicelui crescut de letalitate. Autorii prezintă date de incidență a meningitelor sub forma celor trei grupe notificabile: meningite virale, bacteriene și meningita cerebro-spinală epidemică (M.C.S.E.) pe o perioadă de 10 ani, în Moldova, și caracteristicile procesului epidemiologic. Incidența medie pe interval a fost de 17,0 la 100000 locuitori, cu variații între 36,0 și 7,08 la 100000 locuitori, cu tendință de scădere. Din totalul cazurilor raportate, 48,9% sânt reprezentate de meningitele bacteriene de altă etiologie decât cea meningococică și 29,9% de meningita C.S.E. Afectarea grupelor de vârstă este particulară fiecărei grupe nosologice, dar menținându-se morbiditatea constant crescută la sugari unde și mortalitatea este mai mare. Evoluția multianuală, sub forma valurilor epidemice cu aspect asemănător pentru meningita C.S.E. și meningitele bacteriene de alte etiologii, indică posibilitatea interferențelor diagnostice.