

CONSIDERAȚII PRIVIND MORBIDITATEA ȘI MORTALITATEA ÎN MENINGITELE BACTERIENE ACUTE

Leontina Dincă Coțofană, Magdalena Peter, Valentina Ionescu,
I.Diaconescu

Clinica de Boli Infecțioase,
Facultatea de Medicină, Craiova

Am analizat 23 cazuri de meningită bacteriană acută: 10 cu evoluție letală, celelalte cu diferite complicații neurologice incluzând: paralizii de nervi cranieni, paralizii, ataxie. 4 bolnavi au fost suspectați de abces cerebral, doi din ei având în antecedente otită medie cronică și unul un traumatism cranian, sugerând posibilitatea ca abcesul să fi fost anterior meningitei. Frecvența factorilor favorizanți a fost semnificativ mai mare la bolnavii care au decedat (70%). În 10 cazuri (43,4%) nu a fost identificată etiologia, cel mai frecvent implicat a fost *Str.pneumoniae* apoi *N.meningitidis* iar ceilalți (staf. aureu, str.β hemolitic, bacili Gram-) au determinat 1-2 episoade fiecare. Starea de comă la internare a reprezentat un semnificativ factor de risc în deces ($p<0,001$). Toți bolnavii au avut valori crescute ale albuminorachiei (>132 mg%) dar hipoglicorachia a fost inconstantă; hipoclorurorachia importantă a fost observată în cazurile cu abces cerebral. O scădere a elementelor în LCR a apărut deși evoluția a fost infaustă. Mortalitatea prin meningita acută bacteriană a fost 12%.