

# CONSIDERAȚII EPIDEMIOLOGICE PRIVIND INCIDENȚA MENINGITEI ÎN JUDEȚUL DOLJ PE O PERIOADĂ DE 5 ANI

Ileana Brâncuș\*, Mihaela Petrescu\*, L.Brâncuș\*\*, Dorina Udrescu\*\*\*

\*I.P.S.M.P., Dolj; \*\*Spitalul nr.2, Craiova

\*\*\*I.I.S.P.S.S.C., București

În teritoriul județului Dolj meningita a fost semnalată sub formă de cazuri sporadice cu incidență mai mare în lunile trimestrului I și IV pentru meningita bacteriană (M.B.) și distribuite relativ uniform pe tot parcursul anului pentru meningita virală (M.V.) (excepție 1994 în care a apărut un maxim al incidenței totale în trimestrele III și IV). În timp ce pentru M.V. există o creștere constantă a incidenței totale, atingând un vârf în 1994, pentru M.B. există o scădere constantă, ajungând la 0 în 1993 și doar 5 cazuri la copii în 1994. Cauza evoluției M.B. sub acest aspect considerăm a fi folosirea de antibiotice cu spectru larg nou intrate în țară după 1990 și folosite în acele afecțiuni bacteriene ce preced de regulă meningita bacteriană și tratate încă de la nivelul dispensarelor medicale teritoriale. În paralel se constată și o scădere a meningitei meningococice. Din analiza incidenței specifice pe grupe de vârstă se constată o afectare mai mare a grupelor până la 15 ani față de restul populației de aproximativ 10 ori atât la M.B. cât și la M.V. De asemeni se constată că M.V. afectează mai mult copiii în urban (10-14 ani) și mai mult populația adultă din rural, în timp ce M.B. atinge mai mult populația urbană decât cea rurală la toate grupele de vârstă.