

CONTRIBUȚII LA STUDIUL CLINICO-HISTOLOGIC AL MENINGITELOR PURULENTE

D. Hurezeanu, F. Bogdan, Doina Ene, Livia Dragomir, Carmen Conciovici

Clinica de Boli Infecțioase, Laboratorul de morfopatologie,
Facultatea de Medicină, Craiova

Meningita purulentă constituie prin evoluția dramatică cu rapidă agravare, cât și prin frecvența și gravitatea sechelelor neuropsihice una din problemele acute ale patologiei infecțioase. În lucrarea de față, corelând datele clinice, biologice, terapeutice și anatomo histopatologice ale cazurilor cercetate am încercat să surprindem care sunt relațiile care există între forma clinică, rapiditatea evoluției, terenul pe care evoluează și aspectele anatomo histopatologice. Studiul a fost efectuat pe 20 de cazuri decedate prin meningită bacteriană acută în Clinica de Boli Infecțioase din Craiova în perioada 1980-1994, majoritatea sugari (între 2 și 12 luni) dar și tineri și adulți. Peste 50% proveneau din mediul rural, 55% aparțineau sexului feminin, vârsta cea mai afectată fiind de 6-12 luni, întâlnindu-se cazuri sporadice și la adulți. Au rămas fără etiologie determinată 54,88% din cazuri; în 23% a fost diagnosticat meningicocul, la 18% pneumococul, la 10% a fost izolată Klebsiella și în 0,46% colibacilul și salmonella. La toate cazurile decedate s-a constatat histologic o hiperemie accentuată a meningelor și a substanței nervoase, un edem inflamator, aspecte de endotelită și infiltrate granulocitare perivascular dar și difuze în pânză. Meningitele secundare unor focare de vecinătate au prezentat exudat purulent relativ localizat.