

# MENINGITELE POSTOPERATORII ȘI POSTTRAUMATICE. CONSIDERAȚII PE 87.CAZURI

*Doina Mihalache, V.Luca, C.Scurtu, M.Hurmuzache, L.Prisăcariu, Tatiana Turcu, Elena Râpeanu, Denisa Covaciuc, Florica Dănilă, Alla Vâță*

Clinica de Boli Infecțioase,  
Universitatea de Medicină și Farmacie, Iași

Infecțiile cerebromeningiene postoperatorii și traumatice sunt afecțiuni a căror frecvență este în creștere în ultimele două decenii. În Clinica de Boli Infecțioase Iași în perioada 1.01.1990-31.12.1994 au fost spitalizate 87 cazuri de meningită posttraumatică și postoperatorie; numărul cel mai mare de internări fiind în anul 1992 (26 cazuri). Din cele 37 cazuri de meningită postoperatorie la 13 bolnavi s-a putut aprecia debutul afecțiunii în primele 10 zile de la intervenție. La 3 bolnavi meningita a fost secundară rahianesteziei și la alți 2 după explorări neurochirurgicale (PEG). Traumatismul cranian implicat în producerea meningitei a fost întâlnită în 46 cazuri, 9 bolnavi au prezentat interesarea osului frontal sau etmoidal, iar la alți 7 s-a evidențiat rinolievoree. Simptomatologia clinică a fost mai puțin zgomotoasă, bolnavii prezentând persistența sau reluarea febrei (85%), tulburări psihice (23%), convulsii (16 c.) și redoarea moderată a cefei în toate cazurile. LCR a fost purulent în 48 cazuri (55,1%), opalin la 32 bolnavi (36,78%), hemoragic în 4 cazuri (4,6%) și clar la alți 3 bolnavi (3,42%). Agentul etiologic a fost izolat prin cultură în 30 cazuri (34,5%), remarcându-se în ordinea predominanței: pneumococul (9 c.), meningococul (3 c.), alți coci gram pozitivi (2 c.) și anaerobi (1 c.). Terapia efectuată în funcție de antibiogramă a constat din administrarea de penicilină G în monoterapie (7 c.), penicilina G + cloramfenicol (39 c.), penicilina G + cloramfenicol + rifampicină (23 c.) precum și alte asocieri incluzând cefalosporine III în funcție de etiologia probabilă. În urma tratamentului instituit rezultatele terapeutice au fost următoarele: vindecare în 90,7% din cazuri și deces în 1%, majoritatea insucceselor fiind la pacienții peste 60 de ani.