

MODIFICĂRI ALE IMAGINII PLEURO-PULMONARE ÎN MENINGITELE PACIENȚILOR IMUNODEPRESIVI

L.Păun, Dorina Ionescu, D.Duiculescu, Valentina Simion, Cristina Pătru

Clinica de Boli Infecțioase și Tropicale,
Universitatea de Medicină și Farmacie, București

Un anumit procent de bolnavi HIV sau SIDA cu afecțiuni meningeale, fără alte leziuni maligne sau infecțioase pulmonare, prezintă aspectul

radiologic de pneumonie limfocitară interstițială sau cea de pneumonie interstițială nespecifică. Voi descrie pneumonia limfocitară interstițială (LIP). În clinica noastră, LIP a fost identificat la 50-60% din copiii internați cu SIDA care au făcut diverse boli de plămâni și ale altor organe. Când este prezentă, simptomele sunt nespecifice și identice cu cele ale infecțiilor oportuniste. Radiologic, LIP este exprimată de prezența infiltratelor reticulare sau reticulo-nodulare. De obicei, descriem următoarele aspecte: a) fine benzi interlobulare, septale și intralobulare; b) multipli noduli mici interstițiali și benzi peribronho-vasculare; c) opacități în "geam mat" asociate uneori cu dilatație bronșică.