

ANALIZA ELEMENTELOR DE DIAGNOSTIC ȘI PROGNOSTIC ÎN MENINGITELE TBC

I. Diaconescu, Mioara Cotulbea, Magdalena Peter

Clinica de Boli Infecțioase,
Facultatea de Medicină, Craiova

Pe o perioadă de 8 ani au fost confirmate 20 de cazuri cu meningită TBC, prin izolarea BK din LCR (6 cazuri la copii și 14 cazuri la adulți). Pentru adulți, au fost declarate în această perioadă 36 cazuri cu meningită TBC (ceea ce înseamnă că 61,1% din cazuri au fost diagnosticate doar pe criterii clinice). Pe lotul de adulți, 5 bolnavi au decedat (13,8%) din care 4 au fost confirmați bacteriologic. Mortalitatea s-a corelat cu prezența comei, întârzierea aplicării tratamentului specific. În 2 cazuri s-a administrat cortizon anterior tratamentului specific. Un caz a decedat prin hemoragie digestivă superioară (probabil ca o complicație a corticoterapiei). Toți bolnavii decedați au fost din mediul rural. Sunt analizate particularități clinice și evolutive ale meningitelor TBC confirmate bacteriologic sau/și clinic, comparativ cu alte tipuri de meningită.