

DIFICULTĂȚI DE DIAGNOSTIC ÎN MENINGITA BACILARĂ A COPILULUI

*Doina Stănescu**, *V.Marțincu***, *Narcisa Nicolescu**, *Teodora Moisil***,
*Emilia Nicoară**, *V.Musta**

*Universitatea de Medicină și Farmacie
**Spitalul Clinic Nr.4 V.Babeș, Timișoara

Morbiditatea crescută prin tuberculoză reprezintă în țara noastră o problemă medicală, cât mai ales una socială. Din punct de vedere medical îmbolnăvirile prin tuberculoză cunosc nu numai o frecvență crescută cât mai ales dificultăți de diagnostic. Studiul nostru a cuprins un număr de 20 copii cu meningite sau meningoencefalite bacilare internați în Clinica de Boli Infecțioase Timișoara pe perioada 1.01.1990 - 31.03.1995. Din datele obținute se desprind câteva aspecte particulare: a) creșterea numărului de îmbolnăviri în ultimii doi ani; b) scăderea numărului de forme clinice tipice de boală; c) frecvența abaterii de la modificările clasice cunoscute ale constantelor LCR pentru 75% din cazuri în anii 1994-1995; d) scăderea semnificativă a letalității pentru această îmbolnăvire 12,5% în anii 1994-1995 față de 50% în anii 1990-1993.