

ELEMENTE DE PROGNOSTIC AL MENINGOENCEFALITELOR TUBERCULOASE

Ileana Rebedea, F.A.Căruntu, Liliana Preoșescu, Roxana Dumitriu, A.
Streinu Cercel, C. Apostolescu, Diana Costăchescu

Clinica de Boli Infecțioase,
Universitatea de Medicină și Farmacie, București

Studiul retrospectiv a fost efectuat pe un lot de 40 de bolnavi adulți cu meningoencefalită tuberculoasă, internați în Spitalul de Boli Infecțioase Colentina în perioada 1991-1995. Au fost studiate factorii care ar fi putut influența evoluția nefavorabilă a bolii. Bolnavii au fost împărțiți în două loturi comparative: lotul A-pacienți decedați în spital=12 (30%) și lotul B-pacienți cu evoluție clinică favorabilă (ameliorați/vindecăți). Diagnosticul de meningoencefalită tuberculoasă a fost pus prin metode nespecifice: context epidemiologic, examen clinic, examen citochimic al LCR, IDR la PPD și coexistența tuberculozei pulmonare.

FACTORII CARE AU INFLUENȚAT EVOLUȚIA BOLII

	LOTUL A (pacienți decedați)	LOTUL B (pacienți cu evoluție favorabilă)
Vârsta	100% > 25 ani dintre care 50% > 50 ani	52% < 25 ani
Prezența comei la internare	75%	30%
Coexistența tuberculozei pulmonare	50%	30%
Etilism cronic	80%	30%
Durata bolii până la diagnostic (media aritmetică)	22 zile	11,5 zile

Din datele prezentate mai sus se pot desprinde următoarele concluzii:

- a) un rol important în evoluția nefavorabilă, spre exitus, al bolnavilor cu meningoencefalită tuberculoasă îl au: vârsta înaintată, coexistența tuberculozei pulmonare și a etilismului cronic și prezența comei la internare;
- b) factorul decisiv, care influențează major prognosticul bolnavului, este durata evoluției bolii până la diagnosticare și până la instituirea tratamentului etiologic.