

OBSERVAȚII PRIVIND PROFILUL CLINICO-ETIOLOGIC AL HEPATITELOR ACUTE VIRALE LA COPII

Doina *Stănescu**, Teodora *Moisil*** , Emilia *Nicoară**, A.*Andriuță****, Narcisa *Nicolescu**, V.*Musta**

*Universitatea de Medicină și Farmacie

**Spitalul Clinic Nr.4 V.Babeș, Timișoara

***Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Chișinău (Republica Moldova)

Studiul se bazează pe analiza comparată a două loturi de copii spitalizați în Clinica de Boli Infecțioase Timișoara între anii 1990-1993. În grupul A de 200 cazuri precizarea etiologică s-a făcut prin determinarea doar a AgHBs și Ac anti HBs. În lotul B de 41 de cazuri s-au determinat următorii markeri virali: AgHBs, anticorpi anti HBs, IgM anti HBc, IgG anti HBc, AgHBe, Ac anti HBe, IgM anti D, IgG anti D și Ac anti HVC. În acest studiu am analizat asocierea dintre markerii virali și formele clinico-evolutive ale hepatitei acute virale. Am constatat că folosind toți markerii uzuali al hepatitei de tip B în cazurile de hepatită acută virală incidența hepatitei acute de tip B găsite de noi a crescut de 7,7% în primul grup la 15% în al doilea.