

# HEPATITA VIRALĂ ACUTĂ B ȘI DURATA ANTIGENEMIEI HBs

*L.Păun, Simona Erscoiu, Mihaela Cotigă, Eugenia Mihai, Carmen Bărbulescu, Roxana Rădoi, Gh.Enache, E.Ceașu, P.Calistru, V. Iacobescu, Silvia Verescu*

Clinica de Boli Infecțioase și Tropicale,  
Universitatea de Medicină și Farmacie, București

3180 cazuri de hepatită virală acută (HVA) au fost depistate în perioada 1.01.1993-31.12.1994 în Clinica de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș" din București. În această perioadă s-au diagnosticat 848 (26,66%) de hepatite B (HVB) repartizate astfel: 290 cazuri (35,45%) la copii și 585 (64,55%) la adulți. S-au înregistrat 15 forme fulminante, cu comă hepatică (1,76%) din care 12 au decedat (80%). 73,33% din formele fulminante au fost date de virusul B. Au fost recuperate 3 cazuri, din care unul a fost dat de virusul B și cu coinfecție cu virusul D. HVD a fost depistată doar la 16 bolnavi (1,88%), datorită testării sporadice a anticorpilor anti HVD. Supravegherea, în perioada de convalescență, timp de 6 luni, s-a efectuat doar la 216 bolnavi (25,48%), restul fiind pierduți din urmărire prin neprezentare sau prin neapartenență teritorială. La sfârșitul perioadei de supraveghere doar 106 convalescenți (49,07%) au pierdut AgHBs. Numărul mic de bolnavi urmăriți în perioada de convalescență și inconsecvența cu care aceștia s-au prezentat la control, nu permit aprecierea exactă a ratei cronicizării HVB.