

# HEPATITA CU VIRUS D ÎN ROMÂNIA: INCIDENȚA, PROGNOSTIC ȘI PROFILAXIE

*M. Angelescu, Elisabeta Benea, Victoria Aramă, Doina State*

Clinica de Boli Infecțioase,  
Universitatea de Medicină și Farmacie, București

În paralel cu endemicitatea ridicată a infecției cu virus hepatitic B (peste 15% din populația României prezintă markeri VHB), circulația

interumană a virusului D înregistrează cote alarmante. Coinfecția VHB+VHD este deseori prezentă în hepatitele acute fulminante letale; suprainfecția cu VHD crește rata de cronicizare a hepatitei B de la 10-15% până la 50-80%. La 124 de bolnavi cu hepatită cronică internați în clinică între 1.10.1991 și 30.04.1993 s-au cercetat markerii serici ai VHB+VHD, și VHC. Din lotul de 124 hepatite cronice, 42 de cazuri au prezentat markeri VHB+VHD, 33 de cazuri ai VHD, 17 cazuri ai VHC, 5 cazuri ai VHB+VHC; în 27 de cazuri serologia a fost negativă (hepatite cronice etanolice sau toxice). Corelând situația clinică cu rezultatele diagnosticului serologic s-a constatat că formele clinice cele mai severe (hepatite cronice active și ciroze decompensate) s-au înregistrat în cazul asocierii HB cu HD.