

STUDIUL FACTORILOR DE RISC IN HEPATITELE ACUTE VIRALE B ȘI NON-A, NON-B

*D.Cârstina**, *A.Neamțu**, *D.State***

*Clinica de Boli Infecțioase, Universitatea de Medicină și Farmacie, Cluj-Napoca

**Universitatea de Medicină și Farmacie, București

Am comparat aspectele demografice, educaționale, epidemiologice și clinice la bolnavii cu hepatită acută virală non-A din Cluj. Au fost luați în studiu 100 pacienți cu hepatită acută virală non-A (IgM anti-VHA negativi) care au fost testați pentru AgHBs (ELISA automatizată). În funcție de tabloul clinic și rezultatele testării, bolnavii au fost împărțiți în 3 grupe: hepatita acută cu AgHBs pozitiv (grupa A), hepatita acută cu AgHBs negativ (grupa B), hepatita recidivată cu AgHBs negativ (grupa C). 57 pacienți au avut AgHBs pozitiv la internare (grupa A), 38 au prezentat AgHBs negativ (grupa B), iar 5 cazuri au fost recidive cu AgHBs negativ (grupa C). Nu s-au observat diferențe statistice semnificative privind caracteristicile demografice și nivelul de instruire al bolnavilor din grupele studiate. La grupa B profesiile medicale au fost decelate în 10%, iar la grupa A în 4% din cazuri. Procentul de pensionări a fost 30% la grupa A, respectiv 13% la grupa B. La cazurile cu anchetă epidemiologică pozitivă, asocierea cu risc de transmitere parenterală a fost decelată la 87% din cazurile din grupa A, respectiv la 70% din pacienții grupei B. La toate cele trei grupe studiate au predominat formele medii de boală. Prevalența cazurilor cu insuficiență hepatică a fost 28% la grupa A și 26% la grupa B. În etiologia hepatitelor acute non-A din Cluj predomină VHB. Profesiile medicale sunt mai frecvent întâlnite la pacienții cu hepatita non-A, non-B decât la cei cu hepatita B. Asocierea cu factori de risc pentru transmiterea parenterală predomină la bolnavii cu hepatita acută B și la cei cu hepatita acută non-A, non-B. Formele clinice și frecvența apariției complicațiilor sunt asemănătoare la loturile studiate.