

# HEPATITA B LA PERSONALUL MEDICO-SANITAR DINTR-UN SPITAL DE BOLI INFECȚIOASE, COMPARATIV CU SPITALE CU PROFILURI VARIATE, PRECUM ȘI CU ALTE GRUPURI POPULAȚIONALE

*M. Angelescu, Elisabeta Benea, Victoria Aramă, V. Pandelescu*

Clinica de Boli Infecțioase,  
Universitatea de Medicină și Farmacie, București

A fost cercetat timp de 5 ani personalul medico-sanitar (medici, surori, infirmiere, funcționari, meseriași) al unui spital de boli infecțioase format din 320 de persoane. Proporția de îmbolnăviri de hepatită virală a fost de 15%; 76% dintre bolnavi au prezentat infecții parenterale cu VHB. In loturile comparative (inegale numerice), incidența infecției cu VHB a fost:

a) personalul dintr-un spital vecin, cu profilurile multiple (boli interne, neurologie, dermatologie, chirurgie, policlinică) - 9%; b) donatori de sânge - 4,8%; c) o colectivitate militară - 3,6%. Locurile de muncă cele mai expuse, în ordine descrescândă, au fost: laboratoarele; secția de hepatită; secția de SIDA; camera de gardă. Cele mai puține îmbolnăviri s-au notat la infirmiere și la personalul tehnico-administrativ. Se discută dacă hepatita virală la personalul medicosanitar este boală profesională sau accident de muncă. Vaccinarea anti-VHB are indicație majoră, ca și tehnica aseptică de lucru, materialul cel mai infecțios fiind sângele (pericol de infecție cu virus C).