

CERCETAREA CLINICĂ ȘI DE LABORATOR A FOCARELOR FAMILIALE DE INFECȚIE VIRALĂ B

L.Iarovoi, C.Andriuță, V.Pântea

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie,
Chișinău (Republica Moldova)

S-a făcut studiu asupra unui lot de 67 focare familiale cu un număr de 167 persoane. Hepatita virală B acută (HVBA) a fost depistată la 46 din 167 investigați (28%), hepatita virală cronică activă B (HVBCA) - la 15 (9%), hepatita virală cronică persistentă B (HVBCP) - la 28 (16%) și portaj de AgHBs la 21 (13%). Tabloul clinic la 46 bolnavi cu HVBA s-a manifestat prin următoarele sindroame clinice: astenie (92%), dispeptic (86%), colestatic (90%) și simptome: hepatomegalie (100%), splenomegalie (46%). ALT la toți bolnavii a fost mărită, proba cu timol la 52% mărită, proba cu sublimat la 62% scăzută, bilirubina mărită în 97% cazuri. În majoritatea cazurilor erau decelați AgHBs și anti HBcor sumar. Tabloul clinic la bolnavii cu HVBCA s-a manifestat prin sindroame clinice: astenic (74%), dispeptic (28%), colestatic (15%) și simptome: hepatomegalie (55%). Acești bolnavi s-au confirmat prin depistarea de AgHBs la 14 persoane, de anti HBcor sumar la 15, de AgHBc - la 12 (anti HBe la 2). Testele biochimice: ALT mărit până la 5 mmoli/ore/1 la toți bolnavii, proba cu sublimat micșorată la 13 bolnavi (86%) până la 1,0 - globulina mai mare de 22% la toți cei 15 bolnavi. La 28 bolnavi cu HVBCP erau expuse acuzele sindromului astenovegetativ (48%) sau dispeptic (22%). La 25 dintre ei a fost depistat AgHBs, anti HBcor sumar - la 26, anti HBe la 12 (din 15), anti HBs la 1 (din 2), AgHBe nu s-a decelat la nimeni. Hepatomegalia s-a constatat în 22 cazuri (72%), ALT era mărită la 11 (32%), iar bilirubina la 7 bolnavi (25%), proba cu sublimat micșorată la 20 bolnavi (71%), globulinele mărite la 25 bolnavi (89%). La persoanele cu portaj de AgHBs simptome clinice sau modificări biochimice n-au fost depistate. Din studiul

făcut asupra unui lot de 67 focare familiale cu 167 persoane, din care 110 (66%) au fost infectate cu virusul B: hepatita virală B acută la 46 persoane, hepatită virală B cronică activă la 15, hepatită virală B cronică persistentă la 28, portaj de AgHBs la 21.