

INCIDENȚA MARKERILOR VIRUSURILOR HEPATITICE LA GRAVIDE

Teodora Moisi^{*}, A.Andriușă^{*}, I.Munteanu^{**}, Doina Stănescu^{**}

^{*}Spitalul Clinic Nr.4 V.Babeș

^{**}Universitatea de Medicină și Farmacie, Timișoara

Cercetarea markerilor hepatitici s-a extins în ultimii ani și asupra unei importante grupe de risc: femeia gravidă. Au fost luate în studiu 253 de gravide din Județul Timiș, internate în Spitalul Clinic Nr.1 - Clinica de Ginecologie, pe perioada 1992-1994 și investigate imunologic la Spitalul Clinic Nr.4. S-a urmărit incidența markerilor hepatitici, folosind truse ELISA de generația a II-a. Se constată că din lotul studiat de 253 de gravide, 24 de paciente prezintă AgHBs (9,5%); 48 paciente prezintă anticorpi anti-HBs (18,9%); 52 paciente prezintă anticorpi anti HBc (20,5%); 12 paciente prezintă AgHBe (4,7%); 31 paciente prezintă anticorpi anti HBe (12,2%). Din cele 24 de cazuri depistate AgHBs pozitiv la 3 paciente s-a evidențiat anticorpi anti delta. Urmărind incidența infecției cu virus hepatitic C s-au depistat un număr de 35 de cazuri la care anticorpii anti-HCV au fost pozitivi. Apreciem că studiul de față are importanță epidemiologică și clinică ținând cont de transmiterea verticală a virusurilor hepatitice și de evoluția imprevizibilă a sarcinii și fătului. Datele acestui studiu demonstrează însemnătatea investigării markerilor imuni și constituie o premiză în vederea generalizării și obligativității acestor determinări la viitoarele mame, cunoscută fiind atât acțiunea teratogenă a virusurilor hepatitice cât și posibilitatea efectuării profilaxiei îmbolnăvirilor la nou-născut.