

INCIDENȚA INFECȚIEI CU VHB ȘI VHC LA PACIENȚII CU HEMOPATII

*Hortensia Ioniță**, *I. Marincu***, *Rodica Mihăescu**, *L. Chevereșan**, *L. Negruțiu***, *Maria Bătrân**, *Natalia Roșiu*****, *Elena Jenariu****, *Anca Chevereșan**, *Liliana Marincu**, *Marcela Popescu*****

*Clinica de Hematologie

**Clinica de Boli Infecțioase, Universitatea de Medicină și Farmacie

***Centrul de Transfuzie

****Centrul de Sănătate Publică, Timișoara

Autorii și-au propus să studieze incidența infecției cu VHB și VHC la un grup de pacienți cu hemopatii internați în Clinica de Hematologie a Spitalului Municipal Timișoara. Au fost luați în studiu un grup de 56 pacienți (B=30, F=26), vârsta medie = 42 ani (limite 18-65 ani), internați în perioada 1.01.-30.06.1995. Depistarea markerilor imunoenzimatici pentru infecția cu VHB și VHC s-a efectuat prin metoda ELISA III, folosind kituri MUREX DIAGNOSTICS Ltd. DARTFORD. Din grupul de 56 pacienți - 38 au prezentat boli hematologice maligne (67,85%) iar 22 au fost spitalizați pentru alte boli hematologice (nemaligne), 39,28%. Precizăm că 28 dintre ei au urmat anterior tratament parenteral. Rezultatele screeningului, diagnostic efectuat în vederea depistării markerilor imunoenzimatici ai infecției cu VHB și VHC evidențiază: 13 pacienți au fost depistați AgHBs pozitivi (infecție cu VHB) reprezentând 23,21% - din care 3 cazuri au prezentat coinfecție VHB +VHD, iar 5 cazuri au prezentat Ac.anti VHC (infecție cu VHC) - respectiv 8,92%. În concluzie, pacienții cu hemopatii prezintă un grup de risc atât pentru infecția cu VHB cât și pentru infecția cu VHC.

Având în vedere terenul disimun pe care evoluează majoritatea hemopatiilor cât și infecțiile cu virusuri hepatitice, se impun măsuri de diagnostic precoce și tratament adecvat care pot influența evoluția ambelor entități clinice.