

IMPLICAREA INFECȚIEI CU VIRUSURILE HEPATITICE B ȘI C ÎN HEPATITELE CRONICE

Dana Cioflec*, O.Pop**, R.Străin**, Emilia Nicoară**, L.Negruișu**, N. Doroiu***, P.Măcicășan***, Diana Laza****, Adriana Suta*, Corina Chidioșan**, O. Chirileanu**, Sorina Munteanu**, V. Niculescu**, Natalia Roșiu*

*Centrul de Sănătate Publică

**Universitatea de Medicină și Farmacie

***Spitalul Militar, Timișoara

****Spitalul de Boli Infecțioase, Oradea

Au fost cercetați 321 bolnavi de hepatită cronică și 50 bolnavi de ciroză. Markerii pentru virusurile hepatitice B și C s-au decelat la 260 bolnavi cu hepatite cronice (81%) și la 40 de bolnavi de ciroză (80%). Dintre cei 260 bolnavi de hepatită cronică, 78 au fost cazuri de hepatite cronice active și 150 hepatite cronice persistente. S-a folosit tehnica ELISA cu reactivi Sanofi Diagnostics Pasteur. S-au investigat pentru virusul hepatitic B următorii markeri: AgHBs, AgHBe, AcHBe, iar pentru virusul hepatitic C anticorpul HCV. Din cele 260 cazuri de hepatite cronice la 68 de pacienți (26,1%) s-a decelat doar prezența AgHBs, iar la 38 pacienți (14,6%) s-au evidențiat atât AgHBs cât și AgHBe. În 44 cazuri (16,5%) am detectat asocierea AgHBs-AcHBe. În cadrul aceluiași grup de pacienți (260 cazuri hepatite cronice) s-au decelat AcHCV în 38 de cazuri (14,6%), iar la 51 pacienți (19,6%) s-au detectat AcHCV în asociere cu markerii ai HBV. În concluzie, ponderea markerilor HBV și HCV este ridicată atât în hepatitele cronice cât și în ciroze hepatice. Prezența în procent destul de mare a AgHBe este un indiciu al contagiozității acestor boli.