

SINDROMUL ȘOCULUI TOXIC STREPTOCOCIC ȘI STAFILOCOCIC. CONSIDERAȚII ASUPRA 4 CAZURI

Doina Mihalache, V. Luca, M. Hurmuzache, Tatiana Turcu

Clinica de Boli Infecțioase,
Universitatea de Medicină și Farmacie, Iași

În Clinica de Boli Infecțioase Iași din 1989 au fost diagnosticate 4 cazuri cu sindromul șocului toxic streptococic și stafilococic. Trei din 4 cazuri au fost adulți, doi fiind gazde imunologic compromise prin ciroză hepatică hipertrofică, tuberculoză pulmonară și etilism cronic. Poarta de intrare a fost cutanată în cele 3 cazuri (erizipel în 3 cazuri) și criptogenetică într-un caz. Simptomatologia clinică a fost cvasiasemănătoare cu febră, frison, apariția unui rash eritematos care în cazul implicării stafilococului a fost generalizat urmat de o descuamație spectaculară în lambouri, alterarea stării generale, HTA cu oligurie, tahicardie, subicter, valori moderate de citoliză hepatică (ALAT între 40-50 UI/l). Diagnosticul bacteriologic s-a precizat prin izolarea agenților patogeni din leziunea cutanată. Evoluția bolii sub terapie etiopatogenetică a fost nefavorabilă la 2 pacienți din 4, decesul producându-se prin insuficiență organică multiplă (MSOF).