

LE SYNDROME DE SHOC TOXIQUE STREPTOCOCCIQUE ET STAPHYLOCOCCIQUE. CONSIDERATIONS SUR 4 CAS

Doina Mihalache, V.Luca, M.Hurmuzache, Tatiana Turcu

Clinique des Maladies Infectieuses,
Université de Médecine et Pharmacie, Iași

En 1989, nous avons diagnostiqué dans la Clinique des Maladies Infectieuses, 4 cas de syndrome de choc toxique streptococcique et staphylococcique (TSST). Dans tous les 4 cas, 3 étaient adultes (2 immunodéprimés: sans large cirrose du foie, tuberculose pulmonaire, éthilisme chronique). La porte d'entrée était cutanée en 3 cas (erysipèle) et restait inconnue dans 1 cas. La symptomatologie clinique était: fièvre, frisson, rash érythémateux (généralisée suivi par desquamation spectaculaire, en lambeau, quand l'agent étiologique était le *Staphylococcus*), modifications de l'état général, hypotension artérielle avec oligurie, tachycardie, ictère, cytolysé hépatique modérée (ALAT 40-50 UI/l). Le diagnostic bactériologique était précis par l'isolement de l'agent pathogène dans des lésions cutanées. Sur thérapie étiotrope l'évolution de la maladie était défavorable en 2 cas sur 4 (cause de décès - insuffisance organique multiple - MSOF).