

ASPECTE CLINICO-EVOLUTIVE PARTICULARE ÎN SEPTICEMIA STAFILOCOCICĂ

Lavinia Alexandrescu, M.Dragomirescu, L.Negruțiu, V.Marțincu, Irina
Barabaș, Manuela Curescu, I.Cuculescu, I.Marincu, L.Sălăgean

Clinica de Boli Infecțioase,
Universitatea de Medicină și Farmacie, Timișoara

Pe un studiu referitor la 48 de cazuri de septicemie stafilococică au fost delimitate următoarele elemente: a) focarul inițial a fost în 66,66% din cazuri cutanat (foliculite, panariții, abcese, carbuncul), în 10,4% avort septic iar în câte un caz ocular, prostatic, osos și dento-gingival în 14,5% cazuri nu s-a putut identifica poarta de intrare); b) metastazele septice au fost localizate cu precădere pulmonar 39,5% (bronho-pneumonii, pneumonii lobare, un caz de pneumonie gangrenoasă), urmate ca frecvență de localizările musculare 25% (miozite supurate sau catarale), nevaxitice 22,9% (meningite, meningo-encefalite, tromboflebite intracraniene), cardiace 20,8% (endocardite, endomiocardite, pericardite, cu confirmare ecocardiografică, unele pe fond de valvulopatii reumatismale preexistente), articulare 14,5% (artrite septice) cutanate 10,4%, renale 10,4% (cu IRA), hepatice 6,2% (hepatite septicemice) și un abces splenic rezolvat conservator; c) majoritatea pacienților au prezentat localizări metastatice la nivelul a două aparate sau sisteme (45,8%), 39,5% au prezentat localizări secundare într-un singur organ sau sistem, restul prezentând trei sau patru localizări metastatice; d) mortalitatea a fost 8,3%. Sintetizând deci, particularitățile cazuisticii au fost: a) corelarea severității cu poarta de intrare puerperală (avortul septic), ca urmare a faptului că au necesitat asistență îndelungată, au avut numărul cel mai mare de metastaze septice și caracter sechelar; b) într-un caz, o poartă de intrare de minoră importanță (orgelet suprainfectat), a dezvoltat o formă severă, cu meningită purulentă, oftalmie supurată, urmată de cecitate bilaterală; c) terapia etiotropă a impus triple asocieri sinergice în funcție de chimiosensibilitate și penetrabilitatea implicată de țesuturile afectate.