

ASPECTELE CLINICO-EPIDEMIOLOGICE ALE TUSEI CONVULSIVE ÎN RAPORT CU INTRODUCEREA VACCINĂRII TETRACOQ ÎN JUDEȚUL DOLJ

Mihaela Sava, Daniela Capac, Teofinia Gavrilă

I.P.S.M.P. Dolj

În județul Dolj copiii născuți în perioada 1 iulie 1992 - 1 iulie 1994 au beneficiat de vaccinarea polio-combinată cu produsul francez Tetracoq. Vârsta de debut a primovaccinării a coborât cu o lună astfel încât sugarul începea vaccinarea de la 2 luni în loc de 3 luni ca în cazul DTP-ului. S-au luat în studiu cazurile de tuse convulsivă internate în Clinica de Boli Infecțioase Craiova. S-a studiat cazuistica supusă vaccinării pe TQ, deci născuții în perioada 1 iulie 1992 - 1 iulie 1994 pe o perioadă de 2 ani și 9 luni, față de cazuistica supusă vaccinării DTP, deci născuții în perioada 1 iulie 1990 - 1 iulie 1992 pe o perioadă de 2 ani și 9 luni de viață. S-au analizat foile de observație (număr de zile de spitalizare, complicațiile, medicația etc.) și datele de vaccinare oferite de registrele unice de imunizări de la nivelul dispensarelor teritoriale. Vaccinul tetravalent și-a dovedit superioritatea față de vaccinul trivalent românesc prin scăderea cazuisticii prin tuse convulsivă. Vârsta de îmbolnăvire la cei nevaccinați coboară la sub 2 luni față de 3-4 luni. Asigurarea condițiilor de conservare a produselor biologice la care s-a adăugat o supraveghere strictă a vaccinării pot fi factorii care au concurat la creșterea eficienței vaccinării cu componenta pertusis.