

ASPECTS ETIOLOGIQUES ET CLINIQUES DES ENTEROCOLITES INFECTIEUSES DE L'ENFANT

Madelenă Drăgan, Monica Luminos, Rozina Iagăru, Ruxandra Măntescu,
Elena Gheorghe

Clinique des Maladies Infectieuses-Pédiatrie,
Université de Médecine et Pharmacie, Bucharest

L'étude des enterocolites aiguës a été effectuée sur 3000 enfants, âges de 0 à 14 ans, hospitalisés dans la Clinique de Maladies Infectieuses-Pédiatrie - Colentina. 1014 enterocolites infectieuses ont été comparées avec un groupe témoin (62,2%) enterocolites, qui en majorité, ont eu une diarrhée par malalimentation ou parentérale. Le spectre étiologique des enterocolites infectieuses a été dominé par les Shigelles, en proportion de 65,6% (665 cas), suivies de 14% (142) E.Coli sérotypable, 10,8% (110) Sallmonelles et 7% (71) infections à Rotavirus. On remarque la fréquence réduite des infections digestives à Campylobacter jejuni/coli - dans 1,8% (18) cas et Yersinia Enterocolitica chez 0,8% (8) enfants. Le protocole de recherche a considéré les paramètres suivants: a) la prépondérance saisonnière; b) les manifestations cliniques; c) les corrélations clinico-thérapeutiques et évolutives etc. Les infections digestives causées par deux agents enteropathogènes associés, ont eu une fréquence réduite, chez 4,5% enfants, mais on remarque l'extrême diversité des possibilités d'associations, ayant pour conséquence un degré accru de la maladie. Le but de l'étude de souligner l'importance du diagnostic précoce des infections digestives aiguës, de la diversité étiologique actuelle, ainsi que la sensibilité des germes aux antibiotiques, pour l'administration d'une thérapeutique précoce et adaptée aux divers formes cliniques.