

ELEMENTE DE PATOMORFOZĂ ÎN INFECȚIILE DIGESTIVE CU SHIGELLA

V. Musta, Doina Stănescu, A. Crișan, Emilia Nicoară, Narcisa Nicolescu

Universitatea de Medicină și Farmacie, Timișoara

Boala diareică rămâne o problemă importantă de patologie infecțioasă datorită incidenței ei mari și mai ales datorită noilor probleme de diagnostic și tratament pe care le pune. Am studiat 573 de cazuri de boală diareică de model invaziv. Cazurile au fost împărțite în 3 categorii de vârstă: între 0-1 an; 1-3 ani și peste 3 ani. În urma studiului s-a observat că formele clinice atipice sunt mai des întâlnite la vârsta de 0-1 an (86%) față de vârsta 1-3 ani

(83%) și peste 3 ani (63%). Sensibilitatea Shigellelor la antibiotice, determinată prin antibiogramă, a fost următoarea: Co 92%, Ne 90%, AcNx 83%, Cl 48%, Ge 31%, Amp 22%, Cot 18%. Numărul mic de Shigella izolate prin coprocultură (9%) din totalul cazurilor de boli diareice de model invaziv se explică în mare parte prin tratamentele cu antibiotice efectuate anterior internării pentru diferite afecțiuni (83%). În concluzie, studiul a confirmat presupunerile noastre de modificare a formelor clinico-biologice în infecțiile cu Shigella și impune revizuirea terapiei antibacteriene; totodată trebuie acționat în vederea conștientizării medicilor de medicină generală de a nu introduce antibiotice în terapia bolilor diareice acute înainte de efectuarea coproculturilor.