

ASPECTELE BOTULISMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

C. Andriuță, Elena Mihnevici, V. Pântea, A. Andriuță

Clinica de Boli Infecțioase, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie,
Chișinău (Republica Moldova)

Pe parcursul a mai multor ani am supravegheat 130 bolnavi cu botulism (adulți 97% - copii - 3%), cu formă ușoară 21,5%, medie - 60,8%

și severă - 17,7%. Ca rezultat al consumului ciupercilor conservate în condiții casnice s-au îmbolnăvit 40,8% pacienți, a produselor de carne conservată - 34,6%, a fructelor, legumelor conservate, pește conservat ori afumat în condiții casnice - 22,3% și numai 2,3% - după carne conservată în condiții industriale. Maladia s-a înregistrat cu o frecvență mai sporită în lunile aprilie-mai a anului. Diagnosticul de botulism, la început a fost stabilit numai la 56,1% bolnavi deoarece spitalizarea în secțiile de boli infecțioase a fost întârziată. La 86,1% pacienți perioada de incubație a fost 48 ore. Dereglări ale văzului au avut loc la 97,7% bolnavi, ale tractului digestiv - la 96,1%, ale vocii - la 64,6%, ale celui respirator - la 17,6%. În 43% cazuri botulismul a fost confirmat serologic dintre care la 76,8% s-a stabilit tipul B. Bolnavilor li s-a indicat un tratament de detoxicare, antibiotice și ser antibotulinic. Au decedat 5,4% din totalul bolnavilor și 30,4% - din cei gravi. Așadar, minimalizând datele epidemiologice și clinice caracteristice, procentul de erori de diagnostic și de spitalizare tardivă a bolnavilor cu botulism rămâne sporit ceea ce necesită cunoștințe mai vaste ale medicilor de alte specialități în patologia dată.