

CONSIDERAȚII CLINICE PE MARGINEA UNUI CAZ DE BOALĂ LYME (POSTER)

Paula Bakos*, Domnica Țetcu*, Iringo Kezdi**

*Clinica de Boli Infecțioase, Universitatea de Medicină și Farmacie

**Clinica de Boli Infecțioase, Spitalul Clinic Municipal, Târgu-Mureș

Boala Lyme este o infecție multisistemică, cu evoluție ondulantă cronică, cauzată de *Borrelia burgdorferi* (Bb). Entitate clinică recunoscută în 1975 în orașelul Lyme - Conneticut, SUA, azi este cunoscută și în Europa, Africa de Sud și Australia. În țara noastră primele cazuri au fost descrise în 1988. Deși rar diagnosticată, în realitate este mult mai frecventă. Această discrepanță se datorează evoluției cronice, cu manifestări variate nespecifice (cutanate, miocardice, neurologice, articulare, oculare etc.) astfel fiind un mare imitator. Diagnosticul clinic este posibil doar în cazul manifestărilor cutanate tipice (eritemul cronic migrator - ECM -, limfadenoză benignă a pielii, acrodermatita cronică atrofizantă), în absența lor este necesar examenul serologic. În lucrare se prezintă cazul unei fete de 12 ani cu ECM localizat la gamba stângă, apărută după 2 săptămâni de la mușcătura de căpușă, care s-a vindecat sub tratamentul cu Penicilină G timp de 7 zile.

Deasemenea se tratează pe scurt și alte manifestări clinice mai frecvente ale infecției cu Bb (miocardice, nervoase, articulare).