

INFECȚII CONGENITALE CU VIRUSUL VARICELO-ZOSTERIAN

Lidia Nanulescu, Ioana Cucuianu, Mihaela Lupșe

Clinica de Boli Infecțioase,
Universitatea de Medicină și Farmacie, Cluj-Napoca

Riscul infecțiilor virale în perioada gravidității este evaluat la 5% (Hillemann). Virusurile recunoscute ca particular periculoase pentru făt

sunt: v.rubeolic, v. herpetic, v.citomegalic. Riscul infecției fetale prin varicela maternă este evaluat la 24%, iar anomaliile congenitale la 5% din feții infectați în trimestrul 1 și 2 al sarcinii. Pe baza a 3 cazuri de infecție congenitală cu virusul varicelo-zosterian (VZV), cazuri cu incidență excepțională în practica clinică, se face o analiză clinico-evolutivă și patogenetică. Cele 3 cazuri au fost: 1.- nou-născut cu varicelă neonatală dintr-o mamă care a prezentat varicelă cu 4 zile înaintea nașterii; 2.- nou-născut cu varicelă în evoluție, cu erupție polimorfă, prezentând și cruste necrotico-hemoragice; 3.- sugar de 7 săptămâni, cu herpes-zoster toracic, născut din mamă care a prezentat varicelă în luna a 5-a de sarcină. Apariția acestor forme diferite de boală după varicelă maternă survenită în trimestrul 2 și 3 al sarcinii, demonstrează modalități diferite de răspuns, în raport cu statutul imun al mamei și cel transmis copilului. Durata persistenței anticorpilor anti-VZV transmiși transplacentar ar fi de cca 6 luni sau mai scurtă, iar nivelul anticorpilor protectori poate scădea rapid în anumite situații fiziopatologice. Lipsa anomaliilor decelabile clinic precum și evoluția favorabilă a îmbolnăvirilor nu concordă cu publicațiile din literatură, care susțin gravitatea extremă a infecțiilor congenitale cu VZV. Apariția herpesului-zoster la vârsta de 7 săptămâni (cea mai mică vârstă raportată în literatură) a putut fi explicată prin depistarea unei stări imunodeficitare (hipogamaglobulinemie, probabil tranzitorie, a nou-născutului). Infecțiile congenitale cu VZV, chiar dacă sunt puțin frecvente, impun condiții stricte de izolare și administrare de imunoglobuline specifice (sau cel puțin polivalente).