

ASPECTE CLINICO-EVOLUTIVE ALE POLIOMIELITEI COPILULUI

Madelena Drăgan, Monica Luminos, Rozina Iagăru, Ruxandra Măntescu,
Elena Gheorghe, Mariana Combiescu

Clinica de Boli Infecțioase-Pediatrie,
Universitatea de Medicină și Farmacie, București

Studiul cuprinde 45 copii internați cu poliomielită în perioada 1982-1989, din care 5 cazuri produse de VPI sălbatic în 1982 și 40 cazuri apărute în perioada 1983-1989, mai ales la recipienții de VPOT și contacții acestora, fiind incriminate tulpini de origine vaccinală, "Sabinlike", VP2 (10) și/sau VP3 (14). Poliomielita a apărut cu frecvența maximă la sugari în 53,3% (24) cazuri, 35,5% (16) au fost copii din grupa 1-5 ani iar 11,1% (5) au fost copii peste 5 ani vârstă, cu predominanța sexului masculin în 55,5% (25) cazuri. Vaccinarea a fost completă la 33,3% (15) copii, incompletă la 8,8% (4) cazuri, 12 copii (26,6%) au fost recipienți de VPOT, 13,3% (6) cazuri au fost contacți de recipienți de vaccin, 11,1% (5) copii nevaccinați, iar la 6,6% (3) datele au fost neprecise. Poliomielita a apărut predominant la sugari primovaccinați sau la contacți nevaccinați, la un interval de 4-30 zile după vaccinare, la recipienții de VPOT, sau de 60 zile la contacții de

recipienți. Formele clinice majoritare au fost forme spinale în 73,3% (33) cazuri, 20% (9) au fost forme spino-bulbare, iar 6,7% (3) forme spino-encefalitice au apărut exclusiv la sugari. Evoluția cazurilor a fost favorabilă, cu vindecare la 64,4% (29) copii, au rămas cu sechele 24,4% (11), iar 11,1% (5) au evoluat letal, fiind sugari cu forme spino-encefalitice (2) și spino-bulbare (3). Cazurile de poliomielite asociate vaccinării s-au datorat nerespectării contraindicațiilor temporare, ca și intrării în contact a copiilor nevaccinați sau vaccinați incomplet, cu recipienții de vaccin.