

CONSIDERAȚII CLINICO-EPIDEMIOLOGICE PRIVIND UN EPISOD EPIDEMIC DE EXANTEM RUJEOLIFORM APĂRUT ÎNTR-O COLECTIVITATE DE COPII

Mihaela Petrescu*, Ileana Brâncuș*, Dorina Udrescu**

*I.P.S.M.P., Dolj; **I.I.S.P.S.S.C., București

Lucrarea de față prezintă observații clinice și epidemiologice referitoare la un focar de boală febrilă cu exantem rujeoliform apărut într-un sat. Focarul cuprinde două colectivități - școlară și preșcolară - și este depistat cu ocazia triajului epidemiologic la începutul trimestrului al III-lea. Diagnosticul clinic este de rujeolă impunând profilaxia prin vaccinare antirujeolică a contactilor de colectivitate. Cazurile cuprind 26% din școlari și 35% din preșcolari, toți cu antecedente vaccinale antirujeolice. Ulterior examenele virusologice ale exudatelor nazo-faringiene au relevat prezența virusurilor Cocksackie tip A6A10 și A1A5, pe lângă USR, ECHO și paragripal tip 3. În concluzie autorii apreciază că incidența rujeolei în populația vaccinată poate fi fals crescută prin imposibilitatea unui diagnostic de laborator corect și rapid. Din punct de vedere practic atrage un consum exagerat de material biologic administrat în focarele considerate a fi de rujeolă.