

VALOAREA DETERMINĂRII SIDEREMIEI ÎN DIAGNOSTICUL DIFERENȚIAL AL AFECȚIUNILOR CRONICE ALE FICATULUI

(Comunicare prealabilă)

Hermann J., Kozma G.

Diagnosticul diferențial al cirozei hepatice compensate și al hepatitelor cronice necirotice pe baza tabloului clinic, a comportării proteinelor serice (proteinemia, probe de labilitate), precum și a probelor hepatice curente prezintă adeseori dificultăți considerabile. Precizarea diagnosticului este posibilă de multe ori numai pe baza tabloului anatomico-histologic.

Pe baza cercetărilor noastre cuprinse în tabelul de mai jos, determinarea á jeune a sideremiei facilitează stabilirea diagnosticului diferențial. Din datele noastre reiese că sideremia á jeune la 10 bolnavi suferind de ciroză nu depășește în esență limitele fiziologice, pe cînd la 30 de bolnavi de hepatită cronică activă necirotică am găsit valori considerabil sporite. Fac excepție acele cazuri notate cu *, în care concomitent cu hepatita cronică s-a putut pune în evidență și un proces inflamator extrahepatic. Cercetările noastre de pînă acum arată, că creșterea conținutului în fier al serului, în general merge paralel cu gravitatea și activitatea procesului de hepatită cronică.

Sideremia á jeune în gama %	Hepatită cronică	Ciroză
60—100	—	6
100—120	2*	1
120—150	4(2*)	3
150—180	3	—
180—200	11	—
200—250	7	—
250—300	3	—

Primită la redacție în ziua de 12 iulie 1956.