

# EVOLUȚIA ENCEFALITELOR RUJEOLICE LA COPIL

Madlena Drăgan, Monica Luminos, Rozina Iagăru, Ruxandra Măntescu,  
Elena Gheorghe

Clinica de Boli Infecțioase-Pediatrie,  
Universitatea de Medicină și Farmacie, București

Studiul encefalitelor rujeolice s-a desfășurat într-o perioadă de 20 de ani (1966-1985), cuprinzând 125 de cazuri din 18500 rujeole internate. Incidența pe grupe de vârstă a fost de 21,6% din cazuri la sugari, 44% au fost copii din grupa 1-5 ani și 34,4% copii din grupa 5-14 ani. Se remarcă frecvența mare a comelor (63%), mortalitatea depășind 82% în comele de gradul IV, incidența paraliziiilor la 26% din copii, sindromul meningeal la 40% din cazuri și în 16,8% din cazuri afectarea trunchiului cerebral cu prognostic sever. Maximum de gravitate s-a înregistrat la sugari, cu un nivel înalt de letalitate de 85,2% și numai 7,4% vindecări, urmați de grupa copiilor 1-2 ani cu 25% vindecări și 56,2% decese. S-a constatat evoluția progresiv favorabilă direct proporțional cu creșterea vârstei, deoarece la copiii din grupa 5-14 ani au fost 55,8% vindecări și numai 18,6% decese.