

EVOLUTION DES ENCEPHALITES ROUGEOLEUSES DE L'ENFANT

*Madelena Drăgan, Monica Luminos, Rozina Iagăru, Ruxandra Măntescu,
Elena Gheorghe*

Clinique des Maladies Infectieuses-Pediatrie,
Université de Médecine et Pharmacie, Bucharest

L'étude sur 125 encephalitis rougeoleuses se deroule pendant 20 ans (1966-1985), 18500 enfants étant hospitalises a cause de la rougeole. L'incidence par groupes d'âge a été: 21,6% nourrissons, 44% enfants 1-5 ans et 34,4% enfants 5-14 ans. On a remarque la grande frequence de comas (63%), dans les comas gr. IV le taux de mortalite depassant 82%, l'incidence des paralysies chez 26% enfants, le syndrom meninge chez 40% cas, seulement 16,8% enfants ont presente l'affection du tronc cerebral avec un pronostic severe. En ensemble, l'évolution des encephalites a enregistre 40,8% guerisons avec restitutio ad integrum, 20,8% sequelles et 38,4% deces. Maximum de gravité a été enregistrée chez les nourrissons, avec un taux de létalité de 85,2% et seulement 7,4% guerisons, suivis par les enfants 1-2 ans avec 25% guerisons et 56,2% deces. On constate l'évolution progressivement favorable directement proportionnelle avec l'âge, car chez les enfants 5-14 ans on a remarqué 55,8% guerisons et seulement 18,6% deces.