

BOLNAVI CU FORME MENINGEALE ACUTE DIAGNOSTICAȚI CU LEPTOSPIROZĂ

Ana Straton, C.Straton, N.Beldiman

Centrul de Sănătate Publică, Iași

În perioada 1989-1994, s-au diagnosticat cu leptospiroză, prin reacția de aglutinare microscopică (R.A.M.) 390 cazuri, internate în spitale și secții de boli infecțioase de pe teritoriul Moldovei cu diferite diagnostice clinice: leptospiroză, viroză respiratorie, hepatită virală, meningită virală, iridociclite, sindrom febril, septicemii, insuficiență hepato-renală, enterocolită acută, febră tifoidă etc. Pe baza datelor clinice și a investigațiilor de laborator (efectuate în dinamică), 38 (9,7%) dintre acestea s-au confirmat cu meningită leptospirotică (9,5% din urban și 10,1% din rural) predominând bărbații (10,8%) față de femei (6,4%). Vârsta bolnavilor a fost cuprinsă între 10 și 60 ani, mai frecvente fiind grupele 10-20 ani (19 cazuri); 21-30 (11 cazuri) și 31-60 (8 cazuri). Bolnavii cu meningită leptospirotică au aparținut unei game largi de profesii: elevi (44,7%), agricultori și crescători de animale (18,4%), muncitori din diferite industrii (18,4%), muncitori din industria cărnii și sector alimentar (13,2%) și alte categorii ocupaționale (5,3%). Serotipurile de leptospire implicate în etiologia leptomeningitelor au fost următoarele: *L.icterohaemorrhagiae* (50%), *pomona* (26,3%), *grippotyphosa* (7,9%), *wolffi* și *iași* (câte 5,3%), *borincana* și *canicola* (câte 2,6%). Frecvența cea mai crescută a îmbolnăvirilor s-a înregistrat în sezonul cald (13,2%-31,6%), fapt ce este în strânsă relație cu practicarea scăldatului, înotului sau alte îndeletniciri, în special de către persoanele de vârstă tânără. Rezultatele obținute, necesită o supraveghere susținută atât clinic cât și prin laborator a tuturor cazurilor cu forme meningeale de etiologie neprecizată.