

LE TRAITEMENT MEDICAL DES EPIDURITES SPINALES (CONSIDERATIONS SUR 20 CAS)

V.Luca, Doina Mihalache, C.Scurtu, Tatiana Turcu, Iulia Placinski,
Florica Dănilă, Irina Iacob, St.Dimitriu

Clinique des Maladies Infectieuses,
Université de Médecine et Pharmacie, Iași

Nous avons fait une étude sur 20 cas des epidurites spinales staphylocociques hospitalises dans notre service dans une periode de six anees (1989-1994). La porte d'entre de l'agent patogen était connue dans 13 cas: malformations vertebrales (2 cas), spondylodiscite des staphylococcies cutanées et sous cutanées, des manevre iatrogenes rachianesthesie (3 cas - avec un foyer infectieuse concomitante). La tableau clinique a evolue classiquement dans 4 stades en 10 cas (50%). Le diagnostic d'epidurite a été etabli sur des criteres clinique en 11 cas, la ponction de l'espace epidural a été unsole en 6 cas. La traitement s'était fait pas ponction evacuatoire et antibiotherapie par voie systemique et intrarachienne (gentamicine). Le therapie par voie systemique, dependentes des notre possibilites, s'était fait par associations des antibiotiques. Nous avons associe 3 antibiotiques actives sur le staphylocoque (Rif + Cloro + Genta/Oxa ou C3G + Fluoroquinolones + Cloro +/- Aminoglycoside - 3 cas). La durée moyenne de traitement était de 30 jours. Le traitement local s'est fait par introduction de Gentamicine dans l'espace epidural (en moyenne 5-10 administrations - 20-40 mg/dose/jour). Les resultats étaient favorable avec guerison complete (12 cas ameliorations avec des sequelles - paraparese - 3 cas). Dans les septicemies nous avons obtenues la guerison complet dans 1 cas et avec de sequelles mineures en 4 cas. Nous consideritons cette methode comme une alternative utile en traitement des epidurures spinales primaire ou metastatiques (dans les septicemies).