

CONCORDANȚA DINTRE DIAGNOSTICUL ECOGRAFIC ȘI CEL CHIRURGICAL ÎN ICTERUL OBSTRUCTIV

*T.Negomireanu, Carmen Canciovici, Livia Dragonu, Ada Gârniță,
L.Gârniță*

Clinica de Boli Infecțioase,
Facultatea de Medicină, Craiova

Într-o perioadă de 3 ani a fost executată ecografia abdominală la bolnavii internați ca suspecti de hepatită acută virală pentru un sindrom icteric. Dintre cazurile examinate au fost selectați 114 bolnavi la care s-a presupus un icter prin obstrucție mecanică. Bolnavii erau de vârste și sexe diferite, propunându-se la toți intervenția chirurgicală. Ea a fost acceptată și executată la 76 (66,67%) de bolnavi. Obstrucția mecanică a fost confirmată în toate cazurile operate, existând o concordanță etiologică în 84,21% din cazuri. Această confirmare a fost de 100% în cazurile de chist hidactic hepatic, de 90,91% în neoplasmul de cap de pancreas, de 83,33% în neoplasmul de căi biliare și de 77,78% în litiaza biliară. În celelalte cazuri exista obstrucția mecanică, dar alta decât cea sugerată ecografic. Ținând seama de avantajele pe care le are metoda ecografică (simplă, neinvazivă, economică, ușor acceptată de bolnav etc.), ea se recomandă ca metodă de rutină și de prim interes în cazurile de sindrom icteric, având suspiciunea unei cauze obstructive.