

PATOLOGIE CARDIOVASCULARĂ

PATHOLOGIE CARDIOVASCULAIRE

TRAITEMENT DES LÉSIONS DES ARTÈRES RÉNALES LORS DE LA CHIRURGIE AORTO-ILIAQUE

G. Camelot, J. Combe, J.Y. Huart, T. Hennion

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Besançon

Les lésions athéromateuses de l'aorte abdominale et des artères iliaques s'accompagnent fréquemment de lésions sténosantes des artères rénales. Celles-ci entraînent un risque d'insuffisance rénale par destruction parenchymateuse progressive, et peuvent participer à l'existence d'une hypertension artérielle, facteur de risque évolutif de l'ensemble des lésions artérielles.

Il est donc important de connaître la signification pronostique de ces associations lésionnelles, de préciser les méthodes pour en faire le diagnostic, de déterminer les traitements respectifs les différentes lésions et d'en évaluer les résultats.

Cette étude essaie de répondre à ces questions, à partir des cas traités dans le service de Chirurgie Vasculaire du CHU de BESANCON et à partir des travaux publiés dans la littérature. L'attitude actuelle est généralement une chirurgie simultanée des lésions associées, mais le développement des techniques d'angioplastie percutanée rend possible, dans certains cas, un traitement premier des lésions des artères rénales.
