

TESTELE FARMACOLOGICE ÎN DIAGNOSTICUL ANGINEI MICROVASCULARE - SINDROMUL X

*S.Micu, C.Georgescu, Mihaela Opriș, Adriana Mitre, M.Dinesch,
Mihaela Ispas*

Clinica Medicală nr.4
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș

Diagnosticul anginei microvasculare - sindromul X - cuprinde în parte metode curent folosite în practică pentru evidențierea ischemiei miocardice: tabloul clinic, ECG de repaus, ECG de efort. Particularitățile clinice, aspectele nepatognomonice ale traseului ECG de repaus/efort precum și necesitatea de a evidenția modificarea fiziopatologică definitorie a sindromului X - alterarea funcțională a fluxului sangvin prin răspunsul vasodilatator neadecvat de la nivelul microcirculației coronariene - a făcut necesară includerea în algoritmul de diagnostic al testărilor farmacologice:

testul la dipiridamol, adenozină - ATP, dobutamină. Certificarea ischemiei miocardice pe cale farmacologică în contextul coronarografiei în limite normale și al aspectului clinic și ECG nespecific și variabil, este un important element de încadrare a bolnavilor în categoria anginei microvasculare - sindrom X.

Prezentul studiu a luat în discuție eficiența diagnostică a testelor farmacologice (dipiridamol, adenozină - ATP, dobutamină) la un număr de 28 de bolnavi cu angină microvasculară - sindrom X din cazuistica Clinicii de Cardiologie Târgu-Mureș.
