

DATE REFERITOARE LA STUDIUL CLINIC AL HEPATO-COLECISTOPATIILOR ENDOCRINE

C. C. *Dimitriu*, Tr. *Roșca*, L. *Buligescu*

(*Medicală Internă*, 1958. nr. 1., p. 53—65)

Autorii conturează limitele nosologice mai importante aspecte morfo-clinice ale
ale maladiei pe baza datelor bibliografice hepato-colecistopatiei endocrine ce se ob-
și a 265 de cazuri observate, subliniind servă frecvent, sînt următoarele: 1. O
rolul de agent patogen hotărîtor pe care-l perioadă funcțională persistentă. 2. Dure-
are excesul pronunțat de estrogen. Cele rile hepatice cu caracter inflamator și

colici biliare apar în strînsă legătură cu ciclul menstrual. 3. Asimptomatism complet în afară acestei perioade. 4. Tuburări hormonale ce se manifestă și sub formă de simptome clinice. 5. Apariția unor acuze gastro-intestinale vasculare veziculare etc. ca manifestări ale aceluiași tulburări funcționale neuro-hormonale. 6. Ineficacitatea tratamentului obișnuit, fără aplicarea unui tratament hormonal corespunzător și eficace asupra sistemului nervos, duce la colecistopatie organică, uneori chiar la ciroză.

Probabil formarea pronunțată de estrogen își exercită efectul datorită schimbării celor două constante humorale ale organismului: nivelul histaminic al serului se urcă, iar conținutul de calciu scade. Aceasta cauzează modificările patologice ale producerii de bilă și ale tonusului căilor biliare.

În cursul examinării materialului clinic, autorii au găsit la 38,55% dintre bolnavii

biliari asocierea caracteristică simptome neuro-endocrine generale, genito-ovarice locale și hepato-biliare. Formele clinice ale maladiei variază atât după vîrstă (pubertate, adulți, climacterici), cît și după predominanța anumitor sindrome (forme ovariene, neurotice și digestive). Tratamentul e „bipolar”. Suprimarea tulburărilor funcționale endocrine urmărește neutralizarea excesului de foliculină și restabilirea echilibrului ovarian-hipofizar tulburat. În caz de hiperfoliculinemie organică (chist ovarian), intervenția chirurgicală poate deveni necesară. S-au dovedit eficace și medicamentele antihistaminice. Tratamentul hepatic constă în administrarea de lipotropi. În faza de visceralizare a bolii, nu se mai poate aplica decît obișnuitul tratament hepato-biliar, înțelegîndu-se prin aceasta și colecistectomia, în caz de indicație corespunzătoare.

BIREK LÁSZLO